



คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในมัสยิด

เตือนภัยสุขภาพประเด็นโรคไข้เลือดออกในมัสยิด

การรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรมควบคุมโรค ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม ๒๘,๗๓๒ ราย เสียชีวิต จำนวน ๓๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๓.๖๕ ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๓ ซึ่งพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ๑.๓๙ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี ๒๕๖๐ โดยกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างกลุ่มอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี (ประมาณร้อยละ ๒๕.๕๘) และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนมากถึง ๘๑,๐๐๐ ราย

ข้อเสนอในการดำเนินงาน

๑. การเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัย และควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑.๑ ใต้ชื่อห้ามควรมีการคัดกรองหรือเฝ้าระวัง ผู้ที่มาปฏิบัติศาสนกิจ หรือสับบุรุษของมัสยิด หากพบว่ามีผู้ป่วยสงสัยที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า ๒ วัน อ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ต้องรีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล และแจ้งสถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

๑.๒ หากพบว่าสับบุรุษของมัสยิดป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แนะนำให้ใต้ชื่อห้ามแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งทำลายตัวแกยุงลายโดยการพ่นหมอกควันบริเวณโดยรอบมัสยิดและบริเวณรอบบ้านผู้ป่วยระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร พร้อมทั้งรณรงค์ให้สับบุรุษของมัสยิดหรือผู้มาร่วมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาจัดเก็บเศษภาชนะรอบมัสยิด เพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายต่อไป

๒. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

๒.๑ มัสยิดควรมีการกำจัดขยะหรือภาชนะเหลือใช้ ที่จะเกิดให้มีน้ำขังจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในมัสยิด เช่น กระจบอง ยางรถยนต์ กล่องโฟม ฯลฯ

๒.๒ ซัดล้าง ทำความสะอาด และเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำภายในมัสยิด เช่น แท็งก์เก็บน้ำใช้ บ่อเก็บกักน้ำละหมาด ที่อาบน้ำละหมาด ฯลฯ ซึ่งอาจมีไข่อู่น้ำยุงลายเกาะอยู่ โดยเฉพาะที่กักเก็บน้ำสำหรับรดในท้องส้วม ควรทำความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือควรใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ ทุกๆ ๓ เดือน รวมทั้งทำความสะอาดรางระบายน้ำโดยรอบมัสยิดเพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย

๒.๓ แหล่งที่มีน้ำขัง เช่น แจกันพุ่มต่าง อ่างบัว หรือกระถางต้นไม้ ฯลฯ ให้ใช้ปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูง ปลากัด หรือใส่น้ำทะเลแทนน้ำจืด ส่วนแหล่งน้ำใดที่ไม่สามารถใส่ปลากินลูกน้ำได้ ให้ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำแทน

๒.๔ ตัดแต่งพุ่มไม้ประดับให้โล่งโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักยุงลาย

๒.๕ ฉีดพ่นสเปรย์กำจัดยุงตัวเต็มวัยยามมัสยิดก่อนวันที่จะมีการทำกิจกรรมที่ต้องมีคนรวมตัวกันจำนวนมาก เช่น การรำลึกถึงพระเจ้า การละหมาด เป็นต้น

.....

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข